

エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「日点」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 **1回1滴、1日2回(朝、夕)です。**

決められた点眼回数をお守りください。

点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



この点眼液はアレルギー性結膜炎を治療するお薬です。

点眼後

- ・点眼後は目を閉じて、目がしら(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。



※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「日点」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・室温(1～30℃)で保管してください。
- ・開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他の注意すること

- ・医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ・副作用として結膜充血(白目の充血)などがあらわれることがあります。このような症状が続く場合は、医師の診察を受けるようにしてください。
- ・ソフトコンタクトレンズを装用している場合は、点眼前にレンズを外し、点眼後5分以上経過した後に再装用してください。
- ・その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

点眼薬は
決められたとおり
使いましょう

帰宅時には
玄関で衣服や髪を
よく払いましょう

花粉の飛散が
多い時は
外出を控えましょう

花粉の飛散が
多い時は
ふとんや洗濯物の
外干しは避け
ましょう

外出時に
マスクやメガネ
を使いましょう

窓の開閉は
できるだけ減らし、
換気時は
窓を小さく開け、
短時間に

帰宅後は
洗顔、うがいをして
鼻をかみましょう

花粉シーズン
こまめな
花粉症対策
が大切です



Kafun Calendar

