

オロパタジン点眼液0.1%「ニッテ」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方、就寝前)の点眼です。

決められた点眼回数をお守りください。

点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

点眼後

- ・点眼後は目を閉じて、目がしら(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。

※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。



この点眼液はアレルギー性結膜炎を治療するお薬です。



オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 光に当たらないように専用の投薬袋に入れて室温(1～30℃)で保管してください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他の注意すること

- ・ 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ・ コンタクトレンズをしている方は、コンタクトレンズをはずしてから点眼してください。また点眼後は10分以上経過してからコンタクトレンズを装用してください。
- ・ 目が痛い、目やまぶたが赤くなる、目やまぶたの周りが腫れる、目やまぶたがかゆい、頭痛がするなどの症状があらわれた場合には、医師の診察を受けるようにしてください。
- ・ その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。