

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

点眼後

- ・点眼後は目を閉じて、目がしら(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。



この点眼液は、
眼感染症を治療
または予防する
お薬です。



※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 室温(1～30℃)で保管してください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他の注意すること

- ・ 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ・ 息苦しい、全身の皮膚が赤くなる、発疹、血圧の低下などの症状があらわれた場合、使用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 点眼後、しみる・苦いなどの自覚症状が続く場合は、医師の診察を受けるようにしてください。
- ・ その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。