PA・ヨード点眼・洗眼液の希釈方法

PA・ヨード点眼・洗眼液は 4 ～ 8 倍に希釈して使用する製剤です。
希釈方法は裏面をご参照ください。

注意

1. 希釈後は気密容器で冷蔵庫に保存し、速やかにご使用ください。洗眼殺菌に使用する場合は、調製後直ちに（希釈当日中に）ご使用ください。
2. 脱色、混濁及び異物の発生した希釈後の PA・ヨード点眼・洗眼液は使用せず直ちに廃棄してください。
3. 点眼用、洗眼用にのみご使用ください。

ROHTO ロートニッテン株式会社
ロートニッテン　名古屋市南区桜本町40番地の2
問い合わせ先：医薬情報問合せ窓口　TEL:0120-691-910

希釈方法

希釈の準備

・保冷庫から取り出した直後のPA・ヨード点眼・洗眼液は粘性が高く、希釈操作が困難です。希釈に適した液温は約25℃です。以下のどちらかの方法で温めてから希釈してください。(ヨウ素含量に変化はありません)

方法①:25℃の室内で約80分間放置する。
方法②:38℃の保温庫で約15分間加温する。


・希釈は無菌環境下で行ってください。器具、希釈に用いる液は滅菌されたものを使用してください。

希 釈 例


4倍希釈…本品1本(20mL)に対し生理食塩液60mL
6倍希釈…本品1本(20mL)に対し生理食塩液100mL
8倍希釈…本品1本(20mL)に対し生理食塩液140mL

希釈方法の例 (6倍希釈)

1. PA・ヨード点眼・洗眼液全量(20mL)をシリンジにとります。



2. PA・ヨード点眼・洗眼液を、生理食塩液のパック (100mL) へ注入します。



3. 液を混和します。

ご使用の際は表面の「注意」もご参照ください。

2603
P01U01-03