

製品別比較表

2026年7月改訂

	後発品		標準品							
商 品 名	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」									
会 社 名	ロートニッテン株式会社									
規 格	1mL中にレボフロキサシン水和物を15mg含有									
薬効分類	広範囲抗菌点眼剤									
薬 価	19.10 円／1mL		41.60 円／1mL							
薬価差	22.50 円(1mL)									
1瓶薬価差	112.50 円 (5mL)									
効能・効果	〈適応菌種〉 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス(コッホ・ウィークス菌)、シュードモナス属、緑膿菌、ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌 〈適応症〉 眼瞼炎、涙囊炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、眼科周術期の無菌化療法 【標準品と同じ】									
用法・用量	通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。 【標準品と同じ】									
添 加 剤	グリセリン、ホウ酸、pH調節剤		濃グリセリン、pH調節剤							
規制区分 貯 法	規制区分: 処方箋医薬品 室温保存 (外箱開封後は、遮光して保存すること。)		規制区分: 処方箋医薬品 室温保存 (外箱開封後は、遮光して保存すること。)							
製品の 性 状	商品名	性 状		剤形写真						
	レボフロキサシン 点眼液1.5%「日点」	性状: 微黄色～黄色澄明、無菌水性点眼剤 pH: 6.1～6.9 浸透圧比: 1.0～1.1								
	標準品	性状: 微黄色～黄色澄明、無菌水性点眼剤 pH: 6.1～6.9 浸透圧比: 1.0～1.1								
安定性 * 後発品	加速試験(40℃、75%RH、6ヵ月、最終包装製品): いずれの項目(性状、pH、浸透圧比、含量)も規格内									
生物学的 同等性	〔家兎眼房水移行性試験〕 レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」及びクラビット点眼液1.5%各50μLを白色家兎に単回点眼し、1時間後(Tmax)における眼房水中レボフロキサシン濃度(Cmax)を測定した結果、生物学的同等性判定のパラメータである両群のCmaxの対数値の平均値の差は-0.044であり、生物学的同等性の判定基準log(0.90)～log(1.11)(-0.046～0.045)を満たしたことから生物学的同等性が確認された。 <table><tr><td>製剤名</td><td>C_{max}(ng/mL)</td></tr><tr><td>レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」</td><td>3118.7 ± 2061.3</td></tr><tr><td>クラビット点眼液1.5%</td><td>3195.7 ± 1480.2</td></tr></table> (mean ± S.D. n=30)				製剤名	C _{max} (ng/mL)	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	3118.7 ± 2061.3	クラビット点眼液1.5%	3195.7 ± 1480.2
	製剤名	C _{max} (ng/mL)								
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	3118.7 ± 2061.3									
クラビット点眼液1.5%	3195.7 ± 1480.2									
	〔家兎緑膿菌角膜感染モデルに対する効果〕 緑膿菌を接種して作成した白色家兎緑膿菌角膜感染モデルに対し、レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」及びクラビット点眼液1.5%を1日3回、3日間点眼して比較した。両剤ともに生理食塩液に対して有意な眼症状スコアの減少が認められた。また、得られたスコア値を用いて統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。									
連 絡 先										